

5

ANTHAXIA SALICIS, NIEUW VOOR DE VLAAMSE FAUNA (COLEOPTERA : BUPRESTIDAE)

De familie van de Buprestidae of prachtkevers telt ongeveer 12000 soorten in de wereld, waarvan er in Europa een 200-tal voorkomen. Het geslacht *Anthaxia* telt in Europa een 60-tal soorten, 27 in Frankrijk, 15 in Duitsland en maar 3 in Scandinavië. In Vlaanderen leven er vermoedelijk een 3-tal soorten. Hieraan kunnen we nu één soort toevoegen.

Luc Crèvecoeur
Kennipstraat 37
3600 Genk
(foto : Eddy Daniels)

Op 15 mei 1995 werd er op de dijk tussen twee vijvers in het natuurreservaat 'Het Wik' te Genk (FS74) een exemplaar van deze soort aangetroffen. Ook op 30 mei en 14 juni 1996 waren er op dezelfde dijk minstens twee exemplaren van deze soort aanwezig op struweel.

Beschrijving

De kevers zijn door hun vorm en typische kleur gemakkelijk in het veld te herkennen (Figuur 1). De kop en het halsschild zijn blauwachtig gekleurd. De dekschilden vuurrood met rond het schildje een groene vlek. De lengte bedraagt 5-8 mm.

Levenswijze

Het zijn zeer actieve, rondvliegende kevers die we aantreffen bij zonnig weer rond de broedboom of op struweel. De larve van *Anthaxia salicis* is verschillende malen gevonden in Frankrijk onder de schors van droog hout van wilg, esdoorn en vooral eik. De ontwikkeling duurt vermoedelijk twee jaar. De volwassenen zijn op de broedbomen te vinden maar vooral op gele bloemen, waar ze zich tegoed doen aan pollen.

Verspreiding

Anthaxia salicis komt in grote delen van Europa voor, de meest noordelijke vindplaatsen in Midden-Europa liggen in Nedersaksen en de Harz in Duitsland. Recent zijn er ook twee meldingen uit Nederlands Zuid-Limburg (Van Aartsen, 1992). In België was de eerste waarneming op 28 juli 1934 te Suxy (provincie Luxemburg). Vooral na de warme en droge zomer van 1959 werd de soort in 1960 op verschillende plaatsen waargenomen rond Rochefort (Vrydagh, 1961). De afgelopen jaren was de soort in België beperkt tot de

kalkstreken in de Ardennen waar ik ze waarnam te Wavreille, Han-sur-Lesse en Bourseigne-la-Neuve.

Besluit

Anthaxia salicis bereikt hier momenteel de grens van zijn areaal. Dit heeft mogelijk te maken met de droge, warme zomers en zachte winters van de afgelopen jaren. Hierdoor heeft de soort haar verspreidingsgebied uitgebreid. Een aangepast bosbeheer waarbij dode bomen en zieke takken niet meer systematisch worden verwijderd, bezorgt deze prachtkever meer nestmogelijkheden om zich in Vlaanderen te handhaven. Het meer gericht kijken kan ook nieuwe vindplaatsen in Limburg opleveren van deze vrij gemakkelijk te herkennen kever.

Referenties

- BILY, S., 1982. The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna entomologica Scandinavica 10: 1-111.
- HARDE, K.W., 1979. 38. Familie Buprestidae. In: Die Käfer Mitteleuropas, Deel 6: 204-230
- SCHAEFFER, 1949. Les Buprestidae de France. Science Nat.: 1-518.
- VAN AARTSEN, B., 1992. *Anthaxia salicis*, nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera Buprestidae). Entomologische Berichten, Vol 52: 131-132.
- VRYDAGH, J.M., 1961. L'*Anthaxia salicis* (Coleoptera Buprestidae) en Belgique. Bulletin Annuaire de la Société Royale Entomologique de Belgique 97: XI-XII

