

Nachtschade (*Solanum*)

ALGEMENE SLEUTEL

4 soorten, 1 ondersoort:

<i>Solanum</i>	Bitterzoet (<i>S. dulcamara</i>)	Driebloemige nachtschade (<i>S. triflorum</i>)	Glansbes- nachtschade (<i>S. physalifolium</i>)	Zwarte nachtschade (<i>S. nigrum</i>)	Beklierde nachtschade (<i>S. nigrum</i> ssp. <i>scultesii</i>)
kleur van de bloem	paars	geel-groenwit	wit	wit	wit
kleur van de bes	rood (langer dan breed)	groen	groen, lichtgroen geaderd	zwart	zwart
behaving	weinig	verspreid behaard	dicht met klierharen bezet (niet kleverig)	vrijwel kaal	dicht bedekt met lange (klier)haren
divers	vaak klimmend, oudere stengels verhouten	kruipend, ietwat vlezig, bladeren diep veervormig met smalle slippen	kelk na bloei aanliggend tegen vrucht, bladvoet wigvormig	bloemsteel (10)-14-30 mm, kelk na bloei terug geslagen	

Zwarte nachtschade

(*Solanum nigrum*)



plant vrijwel
kaal



Beklierde nachtschade

(*S. nigrum* ssp. *scultesii*)



plant dicht
behaard



Bitterzoet

(*Solanum dulcamara*)



plant vrijwel
kaal



Driebloemige nachtschade (*Solanum triflorum*)



Glansbesnachtschade (*Solanum physalifolium*)



Bitterzoet (*Solanum dulcamara*)

Familie

nachtschadefamilie (*Solanaceae*)

Diagnostische kenmerken

Windende, soms rechtopstaande of liggende, onderaan houtachtige planten. Bessen eivormig of ellipsvormig, scharlakenrood. Bladen langwerpig tot eirond, ongedeeld of (vooral de bovenste) spiesvormig of geoord 3-talig. Bloemkroon tenslotte teruggeslagen, diep blauwpaars, aan de voet van iedere slip met 2 groene, witgerande vlekken, zelden wit.

Hoogte bloeiende plant

50 - 150 cm.

Bloeitijd

Juni - augustus

Levensvorm

Liaan of chamaefyt (winterknoppen boven de grond)


Standplaats

Elzenbossen, bossen op alluvium, heggen, kapvlakten, gefixeerde kustduinen.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	1	1
●	1971-'94	720	720
●	1995 - ...	362	362



Driabloemige nachtschade (*Solanum triflorum*)

Familie

nachtschadefamilie (*Solanaceae*)

Diagnostische kenmerken

Bladen veerspletig tot veerdelig.

Bes 1-1,5 cm in doorsnede, met vele, ca. 1 mm grote steencelkorrels, groen.

Stengels liggend tot opstijgend, behaard.

Bloeiwijze meestal 2- of 3-bloemig.

Bloemkroon geel- tot groenwit, met teruggeslagen slippen.

Hoogte bloeiende plant

15 - 50 cm.

Bloeitijd

Juni - september

Levensvorm




Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Ruderale plaatsen, vochtige zandgronden door vogels bezocht.



Verspreiding

		#wnm	# ex
	... - 1970	0	0
	1971-'94	0	0
	1995 - ...	1	1



Glansbesnachtschade (*Solanum physalifolium* [nitidibaccatum])

Familie

nachtschadefamilie (*Solanaceae*)

Diagnostische kenmerken

Kroonslippen 2-4 mm breed.

Blad met weinige, grove tanden.

Plant niet kleverig, niet onaangenaam ruikend.

Kelslippen tijdens de bloei hoogstens 2 mm lang, in de vruchttijd hoogstens 4 mm lang en de bes slechts deels omsluitend; zaden minder dan 30.

Bes groen met lichtgroene aderen, sterk glanzen, in de top met 2 kleine (ca. 0,5 mm grote) steencelkorrels.

Hoogte bloeiende plant

20 - 50 cm.

Bloeitijd

Juli - oktober

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Ruderale plaatsen, woeste gronden, bermen van waterlopen.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	0	0
●	1995 - ...	0	0



Geen waarnemingen in Limburg.

Zwarte nachtschade (*Solanum nigrum*)

Familie

nachtschadefamilie (*Solanaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stengel meestal duidelijk kantig, met gladde of onregelmatig getande, zwakke lijsten, onderaan kaal of bijna kaal; de jongere delen behaard, met aanliggende, naar boven gekromde haren, zonder lange klierharen, wél met kleine, vrijwel zittende klieren. Bladen gaafrandig, bochtig getand of regelmatig grof getand, bijna kaal.

Hoogte bloeiende plant

15 - 50 cm.

Bloeitijd

Juli - oktober

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)


Standplaats

Hakvruchtakkers, nabij woningen, ruderaal plaatsen; nitrofiel.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	557	557
●	1995 - ...	241	241



Beklierde nachtschade (*Solanum nigrum* ssp. *scultesii*)

Familie

nachtschadefamilie (*Solanaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stengel minder duidelijk kantig, met gladde lijsten, onderaan meestal behaard, de jongere delen dicht behaard, met afstaande, gewone haren en lange klierharen.

Bladen bijna steeds regelmatig grof getand, zelden alleen met een bochtige rand, eerst vrij dicht behaard, later kaal wordend.



Hoogte bloeiende plant

15 - 50 cm.

Bloeitijd

Juli - oktober

Levensvorm




Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Hakvruchtakkers, nabij woningen, ruderaal plaatsen; nitrofiel.



Verspreiding

		#wnm	# ex
	... - 1970	0	0
	1971-'94	0	0
	1995 - ...	0	0



Geen waarnemingen in Limburg.